



ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu
SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Č. j. SRS 018896/2013
ze dne 3. 4. 2013

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) jako správní úřad podle § 72 odst. 4 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 nařízení odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 („dále jen „nařízení EP““)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku CIRRUS CS reg. č. 4475-1

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
zelenina brukvovitá (kromě kedlubny)	plevele dvouděložné jednoleté	0,15-0,25 l/ha	AT	3) preemergentní aplikace, pouze v polních podmínkách

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Dávka vody: 300 – 400 l vody/ha

Max. počet ošetření: 1x v plodině

Růstová fáze plodiny v době aplikace: preemergentně do 3 dnů po zasetí

Růstová fáze plevelů v době aplikace: nejsou vzešlé

Plevelé citlivé: svízel přitula, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku klomazon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Státní rostlinolékařská správa v rámci rozšíření povolení přípravku

CIRRUS CS reg. č. 4475-1

na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 nařízení EP odpovědná za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

2) Závazné podmínky pro zacházení s přípravkem podle přílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 402/2011

Sb.:

a) Označení z hlediska speciálních rizik:

R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

b) Pokyny pro bezpečné zacházení:

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

3) Další označení přípravku podle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 327/2012 Sb., zákona č. 350/2011 Sb. a nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

4) *Doba použitelnosti*: 2 roky od data výroby
za podmínek: teplota skladování + 5 až + 30°C

5) *Varovná označení přípravku*:

5.1 z hlediska vlivu na životní prostředí:

výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 402/2011 Sb.:

Nejsou vyžadovány.

6) *Závazné označení přípravku podle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:*

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Čl. 2

Toto nařízení SRS o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení EP nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku CIRRUS CS (reg. č. 4475-1).

V Praze dne 4. 4. 2013

Bc. Zdeněk Mach
ředitel Státní rostlinolékařské správy

datum vyvěšení na úřední desce SRS: 5. 4. 2013

datum vyvěšení na úřední desce MZe: 5. 4. 2013

datum snětí z úřední desky SRS: 20. 4. 2013

datum snětí z úřední desky MZe: 20. 4. 2013