



Státní rostlinolékařská správa

Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6


Havlíčkův Brod 26.9.2011
čj. SRS 056232/2011

Oblastní odbor SRS
Smetanovo nám. 279
580 01 Havlíčkův Brod

Zpráva č. 18 oblastního odboru HAVLÍČKŮV BROD o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 29.8.–25.9.2011

1. Počasí

Sledované období zachycující konec léta a začátek podzimu probíhalo ve znamení pěkného počasí s příjemnými teplotami. Pouze při přechodu dvou studených front došlo k výraznému ochlazení a místy i k velmi intenzivním srážkám. První přecházela přes naši oblast 5. a 6. září a byla doprovázena silnými srážkami – lokálně naměřeno i více než 50 mm za den. Druhé ochlazení bylo ve dnech 18. až 20. září, kdy průměrné denní teploty poklesly i pod 12 °C. I tato fronta přinesla dešťové srážky, ale jejich úhrn nepřesahoval 30 mm.



Výskyt škodlivých organismů a poruch

Probíhá sklizeň dalších zemědělských plodin. Vysoké výnosy a problémy s odbytem zpomalují sklizeň brambor, podle odhadu je dosud sklizena asi 1/3 ploch a to především množitelských porostů. Byla zahájena sklizeň cukrovky, slunečnice a kukuřice na siláž. Zatím přicházejí zprávy o velmi dobrých výnosech. Současně probíhá setí ozimých obilovin.

OBILNINY

Prvně zaseté porosty jsou již vzešlé a zatím nejsou hlášeny žádné problémy. V současné době je prováděn monitoring kříska a odběr vzorků obilovin (výdrolu) na zjištění výskytu virových chorob.

PŠENICE OZIMÁ (RF 01–12 BBCH)

Ve vzorcích zrna ze sklizně, které byly analyzovány na výskyty snětí, byla dosud zjištěna pouze **sněť zakrslá (*Tilletia controversa*)** a to v okresech Chrudim a Svitavy.

Při smýkání výdrolů byly pozorovány slabé, výjimečně střední výskyty **kříska polního (*Psammotettix alienus*)**. V okrese Jičín byly ve sběrech diagnostikovány také další škodlivé druhy křísků např. **křísek hnědošedý (*Psammotettix confinis*)**, **křísek žlutošedý (*Macrostes laevis*)** nebo **křísek okénkový (*Errastunus ocellaris*)**.

KUKUŘICE (RF 85-89)

Výskyty **sněti kukuřičné (*Ustilago maydis*)** byly všeobecně pouze lokální a slabé - hlášeno z okresů Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod a Pardubice.

Sklizní ploch kukuřic končí sledování náletu **bázlivce kukuřičného (*Diabrotica vngifera*)** pomocí feromonových lapáků. Téměř ve všech okresech došlo u tohoto škůdce k překročení prahu škodlivosti.



Kontroly a záznamy výskytu dospělců na lepových deskách se provádí jednou týdně v období od 20.6. do poloviny října.

Chemická ochrana proti larvám se doporučuje při hodnotě 35 a více dospělců v průměru na jeden lapák za 14 dnů zjištěných v předchozím roce. Aplikují se insekticidní mořidla nebo půdní insekticidy při seti nebo v době líhnutí larev.

Doporučený termín prvního ošetření proti dospělčům v oblasti kontinuálního šíření na pozemcích s opakovaným pěstováním kukuřice nastává v období dvou až tří týdnů po zjištění prvního jedince ve feromonových lapácích, překračujících práh škodlivosti, který je stanoven na 35 a více dospělců v průměru na jeden lapák za 14 dnů.

Náchod je další okres naší oblasti kde byl zjištěn výskyt **lesknáčka čtyřskvrnného** (**Glischrochilus quadripuncatus**) a to v lokalitě Černčice.

Až střední výskyt **zavíječe kukuřičného** (**Ostrinia nubilalis**) byl pozorován na lokalitách Městec a Černčice /okres Náchod/. Z okresů Havlíčkův Brod, Svitavy a Ústí nad Orlicí jsou hlášeny výskyty pouze slabé. Výskyt byl zjištěn i v porostu Bt kukuřice v lokalitě Brdo /okres Jičín/ - odebrány vzorky a zaslány do DL Olomouc.

Proti minulým rokům se zvýšily škody způsobené **prasetem divokým** (**Sus skrofa**) – hlášeno z okresů Havlíčkův Brod, Chrudim, Jičín, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

OLEJNINY

Sklizeň ploch řepky jarní a máku byla ukončena s poměrně dobrými výnosy. Předčasně zaseté plochy řepky ozimé i přes aplikaci morforegulátorů silně přerůstají a stoupají obavy z toho, že porosty špatně přezimují. V důsledku přívalových srážek 5.9. došlo v některých oblastech ke splachu půdy a poškození vzcházejících porostů.

ŘEPKA OZIMÁ (RF 11-19 BBCH)

Zjištěné až střední výskyty **slimáčka polního** (**Deroceras spp**) jsou hlášeny z okresů Jičín /lokalita Kbelnice/, Náchod /lokalita Křínice a Nahořany/, Ústí nad Orlicí /lokalita Květná/ a Svitavy.

Napadení klíčících rostlin **dřepčíkem olejovým** (**Psylliodes chrysocephala**) bylo pozorováno na lokalitách Maršov /okres Náchod/, Bílé Poličany /okres Trutnov/, Jezbořice a Lhota pod Přeloučí /okres Pardubice/, Rohenice /okres Rychnov nad Kněžnou/ a Vysoké Mýto /okres Ústí nad Orlicí/.

Místy až silné výskyty housenic **pílatky řepkové** (**Athalia rosae**) byly zjištěny v okrese Svitavy na lokalitách Osík a Dolní Újezd. Vysoký počet dospělců byl zaznamenán ve žlutých miskách na lokalitě Bílé Poličany v okrese Trutnov.

Výskyt plošných min způsobený **vrtalkou** (**Phytomyza rufipes**) byl pozorován v okresech Havlíčkův Brod /lokalita Pohled/ a Jičín /lokalita Kbelnice/.

OKOPANINY

V hlavní bramborářské oblasti je sklizeň v plném proudu. Nižší nasazení počtu hlíz pod trsem je kompenzováno enormním nárůstem hlíz. Při pozdní desikaci množitelských ploch došlo k přerůstání hlíz a výtěžnost sadby je u těchto partií podstatně nižší. Celkově jsou výnosy nadprůměrné a i škrobnatost průmyslových odrůd je velmi dobrá. Zcela výjimečně je snížena kvalita konzumních odrůd strupovitostí. Byla zahájena sklizeň cukrovky a i u této plodiny je předpoklad velmi dobrých výnosů.

BRAMBOR OBECNÝ (RF 87-99 BBCH)

Zvýšené výskyty **plísňe bramboru** (**Phytophthora infestans**) na hlízách jsou hlášeny z okresů Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Převážně se jedná o malopěstitele, u velkopěstitelů jsou nálezy ojedinělé.

Ve většině okresů bylo zaznamenáno větší napadení hlíz **mokrou hnilobou** (**Erwinia carotovora**). Tyto partie se ponechávají na pozdější sklizeň, aby nedošlo k infekci ostatních hlíz touto chorobou a následným problémům během skladování.

Kvalita konzumních hlíz je zhoršena při zjištění výskytu **drátovců** (**Elateridae ssp.**) – slabé až střední výskyty zjištěny v okresech Havlíčkův Brod a Náchod.



CUKROVKA (RF 45-49)

Střední výskyt **skvrnatičky řepné (*Cerkospora beticola*)** je hlášen pouze z okresu Náchod /lokalita Černčice/. V ostatních okresech /Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice a Svitavy/ zůstávají na slabé úrovni.

V okrese Náchod /lokalita Černčice/ byl zaznamenán výskyt **větevnatky řepné (*Ramularia beticola*)**.

Lokálně střední napadení neošetřených porostů **padlím řepy (*Erysiphe betae*)** bylo zjištěno na lokalitě Lhota pod Libčany v okrese Hradec Králové.

OVOCNÉ DŘEVINY

Na jabloních v lokalitě Svinčany v okrese Pardubice byl pozorován až střední výskyt **vlnatky krvavé (*Eriosoma lanigerum*)**.

V okrese Jičín na lokalitě Úlibice byl při posledním pozorování zjištěn ve feromonovém lapači střední výskyt **klíněnky jabloňové (*Phyllonorycter blancardella*)**.

V sadech Svinčany /okres Pardubice/ bylo zaznamenáno silné poškození listů a následný předčasný opad způsobený **sviluškami (*Tetranychidae spp.*)**.

Bylo ukončeno sledování náletů obalečů a minujících škůdců ve feromonových lapácích.

Za oblastní
odbor zpracoval: Ing. Jiří Jůzl