



Státní rostlinolékařská správa

Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Česká Lípa 26. 4. 2011
č.j. SRS 032410/2011

Oblastní odbor SRS
Pražská 765
440 01 Louny

Zpráva č. 4 Oblastního odboru Louny o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 18. 4. – 24. 4. 2011

1. Počasí

Slunečné jarní počasí, postupně narůstající denní teploty v rozmezí 16 °C až 25 °C a noční teploty v rozmezí 0 °C až 6 °C. Počátkem období četné ranní mrazíky a mírný vítr, beze srážek.



Výskyt škodlivých organismů a poruch

Na polích probíhá přihnojování obilovin tekutými hnojivy a ošetřování herbicidy proti plevelům. V řepce ozimé probíhá druhé insekticidní ošetření proti hmyzím škůdcům. Preemergentně se ošetřuje herbicidy před setím kukuřice, probíhá výsadba košťálové zeleniny. Ve chmelnících se dokončuje řez chmele a probíhá drátkování. V sadech se provádí ošetřování proti květopasu jablonovému a strupovitosti jabloní. Narůstající srážkový deficit negativně ovlivňuje rovnoměrnost vzcházení zasetých porostů a odnožování jarních obilovin.

OBILNINY

Škodlivý výskyt houbových chorob a škůdců byl zaznamenán pouze ojediněle, masivní šíření houbových chorob omezuje současné suché počasí.

PŠENICE OZIMÁ (RF 27-32 BBCH)

Pozorován střední výskyt tečkované plevové a listové skvrnitosti pšenice (*Phaeosphaeria nodorum* E. Müll.) v okrese Louny (Radičeves).

Hodnotí se počet listů s výskytem pyknid tečkované plevové a listové skvrnitosti pšenice u 20 rostlin (odnoží) odebraných při úhlopříčném průchodu porostem (10 míst x 2 rostliny).

Ošetření se provádí při dosažení prahu škodlivosti, jestliže je při pozorování nalezeno více než 12% listů s výskytem pyknid.

První slabý výskyt padlí pšenice (*Blumeria graminis*) byl pozorován v okrese Děčín (Stará Oleška, 20. 4.).

První slabé výskyty imág kohoutka modrého (*Oulema gallaeciana*) a kohoutka černého (*Oulema melanopus*), při pozorování smýkáním, byly zaznamenány v okresech Litoměřice (Nížebohy, Roudnice n. L., Radouň, 18. 4. - 20. 4.) a Česká Lípa (Blíževedly, 21. 4.).

První slabý výskyt kyjatyky osení (*Sitobion avenae*) byl pozorován v okrese Litoměřice (Radouň, 20. 4.).



JEČMEN OZIMÝ (RF 23–33 BBCH)

Pozorovány první slabé výskyty padlí ječmene (*Blumeria graminis*) v okrese Teplice (Bystřany).

První slabé výskyty imág kohoutka modrého (*Oulema gallaeciana*) a kohoutka černého (*Oulema melanopus*), při pozorování smýkáním, byly zaznamenány v okresech Litoměřice (Roudnice n. L., Straškov, 18. 4.) a Česká Lípa (Blíževedly, 21. 4.).

LUSKOVINY

HRÁCH SETÝ (RF 13-19 BBCH)

První výskyt dospělců listopasů (*Sitona spp.*) byl zjištěn v okrese Litoměřice (Račiněves 18. 4.).

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 50–61 BBCH)

Zaznamenán silný výskyt blýskáčka řepkového (*Meligethes aeneus*) v celém okrese Liberec, střední výskyt byl pozorován v okresech Česká Lípa (Kravaře, 21. 4.) a Louny (Blažim, Žatec, Krásný Dvůr). V lokalitách se slabým výskytem se tento škůdce vyskytuje především v okrajových pásech a šíří se postupně do středu porostů. I zde je předpoklad rychlého nárůstu škodlivého výskytu na plochách neošetřených insekticidními přípravky.

Pozorování imág blýskáčka řepkového ve vrcholových květenstvích se provádí 1x týdně od dosažené teploty 9 °C do počátku květu řepky. Kontroluje se květenství 50ti rostlin (10 míst x 5 květenství). Ošetření se doporučuje při překročení prahu škodlivosti, to je při výskytu více než 300 brouků na vrcholových květenstvích 100 rostlin.

MÁK (RF 01-10 BBCH)

Nestejněměrné vzcházení porostů vlivem sucha bylo pozorováno v okrese Litoměřice (Chotěšov).

OKOPANINY:

BRAMBOR (RF 00-15 BBCH)

Ranné odrůdy brambor již vzcházejí na zavlažovaných plochách okresu Litoměřice (Hrdly, Libotenice, České Kopisty).

CHMEL (RF 09-13 BBCH)

Byl pozorován první výskyt klasových výhonů způsobených plísňí chmelovou (*Pseudoperonospora humuli*) v okrese Louny (Kryry, 21. 4.).

Všeobecně silné výskyty dřepčíka chmelového (*Psylliodes attenuata*) byly pozorovány v celém okrese Litoměřice, střední výskyty byly zaznamenány v okrese Louny (Kryry, Kněžice).

Ochranný zásah proti jarní generaci dřepčíka chmelového se doporučuje provést při zjištění střední intenzity napadení, tj. poškození (děrování) 5-10% listové plochy.

První slabý výskyt lalokonosce libečkového (*Otiorhynchus ligustici*) byl pozorován v okresech Litoměřice (Polepy, Vědomce, 20. 4.) a Česká Lípa (Blíževedly, 21. 4.).



OVOCNÉ DŘEVINY

Jádroviny

JABLOŇ (RF 55-64 BBCH)

zjištěn střední výskyt mšice jitrocelové (*Dysaphis plantaginea*) v jižní části okresu Liberec (Pěňčín, Svijanský Újezd, 20. 4.).

Pozorují se zkrabacené a svinuté listy tvořící hnízda. Napadené listy žloutnou a červenají. Pokroucené výhonky. Hodnotí se počet jedinců na 100 květních nebo listových růžic

Jabloně se ošetřují před květem v případě výskytu 1 a více jedinců mšice jitrocelové v průměru na jednu květní nebo listovou růžici. Po odkvětu se jabloně ošetřují, jakmile se zjistí tvořící se kolonie mšic.

Byly zjištěny první slabé výskyty mery jabloňové (*Cacopsylla mali*) v okrese Liberec (Pěňčín, Svijanský Újezd, 20. 4.), pílatky jablečné (*Hoplocampa testudinea*) a klíněnky jabloňové (*Phyllonorycter blancardella*) v okrese Litoměřice (Dobříň 18. 4.)

HRUŠEŇ (RF 62-65 BBCH)

První výskyt imág mery skvrnitě (*Cacopsylla pyri*) zjištěn v okrese Litoměřice (Dolní Nezly).

První výskyt mery hrušňové (*Cacopsylla pyricola*) zjištěn v okrese Liberec (Pěňčín, 20.4.)

Peckoviny

MERUŇKA (RF 69 BBCH)

Silný výskyt píd'alky podzimní (*Operophtera brumata*) v okrese Litoměřice (Slatina, 24. 4.).

Na jaře se pozorují požerky na mladých listech, květních poupatech, květech i plodech ovocných dřevin. V listech vykousané zpočátku drobné otvory, které se postupně zvětšují až zůstávají jen silnější žebra.

Přímou chemickou ochranu doporučujeme při škodlivém výskytu housenek píd'alky podzimní v jarním období a následně doporučujeme nepřímou ochranu zaměřenou na mechanické hubení, po kmeni šplhajících, samiček píd'alky podzimní pomocí lepidel a lepových pásů umístěných na kmenech stromů v období od první poloviny října do února.

Drobné ovoce

RYBÍZ (RF 61 BBCH)

Zjištěn střední výskyt mšic (*Aphididae*) v extenzivních výsadbách okresu Liberec (Pěňčín, 20. 4.).

Ošetření proti larvám a dospělcům mšic doporučujeme od vyrašení kdykoliv v průběhu vegetace, nejlépe na jaře, před vytvořením kolonií mšic.

Za Oblastní odbor Louny zpracoval: Luboš Pomichálek